

## Die Vorteile von Mepilex® Lite auf einen Blick

- geschmacks- und geruchsneutral
- kein Übertritt von aktiven Substanzen in die Muttermilch
- einfach anzubringen (selbsthaftend)
- mehrfach applizierbar (bis zu 7 Tage)
- angenehm zu tragen
- flexibel zuschneidbar
- kann sanft und rückstandslos entfernt werden
- hypoallergen
- andere Pflegeprodukte wie z. B. Cremes, Gels etc. sind nicht nötig

**Wichtiger Hinweis:** Die Pflege wundter Brustwarzen sollte in Begleitung einer Still- oder Mütterberatung, einer Hebamme oder eines Arztes stattfinden.



### Mepilex® Lite Sortiment

Art.-Nr.	Grösse	Pharmacode	Stück/Packung
28 40 00	6 x 8,5 cm	2754714	5
28 41 00	10 x 10 cm	2754720	5
28 43 00	15 x 15 cm	2754737	5
28 45 00	20 x 50 cm	5548122	4

Steril – einzeln verpackt

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.ch](http://www.molnlycke.ch)

Mölnlycke Health Care AG  
Brandstrasse 24, 8952 Schlieren  
Tel +41 44 744 54 00, Fax +41 44 744 54 11  
[info.ch@molnlycke.com](mailto:info.ch@molnlycke.com)  
©2018 Mölnlycke Health Care AB.  
Alle Rechte vorbehalten.

  
**Mölnlycke®**



Schmerzen beim  
Stillen müssen  
nicht sein

Mepilex® Lite

  
**Mölnlycke®**



## Mepilex® Lite

### Die sanfte Lösung gegen Schmerzen beim Stillen

#### Mepilex® Lite ist:

- geschmacks- und geruchsneutral
- einfach anzubringen
- angenehm zu tragen
- auch für empfindliche Haut geeignet

#### Wunde Brustwarzen

... können so schmerzhaft sein, dass viele Frauen sich dazu entschliessen abzustillen. In den ersten Stilltagen ist eine gewisse Empfindlichkeit der Brustwarzen nichts Ungewöhnliches, prinzipiell sollten beim Stillen jedoch keine Schmerzen auftreten. Sind die Schmerzen sehr stark, kontaktieren Sie bitte einen Arzt.

## Behandlungsmöglichkeiten

Ziel der Behandlung ist es, dass sich die geschädigte Haut möglichst schnell wieder regeneriert, damit weitgestillt werden kann. Am Markt sind zahlreiche Wundcremen mit unterschiedlichen Wirkstoffen und Desinfektionslösungen zur Unterstützung des Heilungsprozesses erhältlich. Diese Cremes und Lösungen haben jedoch oft den Nachteil, dass sie Allergien oder sonstige Nebenwirkungen hervorrufen können. Durch Geschmacksstoffe kann das Kind irritiert werden und somit die Brust verweigern.

Mit Mepilex® Lite haben Sie einen sanften, flexiblen Verband gewählt, welcher für Sie und Ihr Kind eine schonende und effiziente Alternative ohne Nebenwirkungen darstellt.

## Anwendungshinweise

1. Brustwarze mit Mepilex® Lite bedecken
2. Während des Stillens Mepilex® Lite abnehmen
3. Nach dem Stillen Mepilex® Lite wieder auf die Brustwarze auflegen

Mepilex® Lite kann diskret unter jedem Still-BH getragen und bis zu 7 Tage verwendet werden. Nach dieser Zeit sollte die Therapie abgeschlossen sein, falls nicht, kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt. Andere Pflegeprodukte sind nicht nötig.

**Achtung:** Ist binnen 24h keine Besserung eingetreten, sollte nach anderen Ursachen wie Soor (Pilzinfektion) geforscht werden. Mepilex® Lite ist auch bei Soor anwendbar, allerdings nur zusätzlich zu einer adäquaten antimykotischen Behandlung.

## Informationen zum Produkt

Mepilex® Lite ist ein sanfter, flexibler Verband, der sich an die Brustform anpasst und bequem zu tragen ist. Durch die spezielle Safetac®-Beschichtung werden eventuelle Wundränder versiegelt und das Mazerationsrisiko minimiert. Wunden können optimal verheilen.