

# Handskepåtagning for Biogel® Indicator® Systemer

'LUKKET påtagning med manchterne i hænderne'

## Ifør dig den sterile kittel og åbn yder-og inderemballagen som anbefalet<sup>1</sup>



1. Stræk ikke hænderne gennemærmernes manchter. Hold manchterne i hænderne som vist på billedet.



3. Læg inderemballagen på det sterile underlag, så handskens fingre peger mod dig. Åbn inderemballagen (de farvede handsker), mens du sørger for at holde hænderne helt dækket af kitlens ærmer. Tag den første handske med din dominerende hånd (den højre handske med din højre hånd, eller den venstre handske med din venstre hånd).



5. Brug din anden hånd, som stadig er inde i kittelærmet, og træk kanten af handsken over din håndryg.



7. Handsken er nu helt på plads. Sørg for, at handsken altid dækker kitlens vævede manchet fuldstændigt. Tag den anden handske op med den ubehandskede hånd, på samme måde som ved første handske.



9. Tag yderhandskerne på. Sørg for at yderhandsken er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned. Tryk kanten af handskens manchet godt ned mod kitlen, for at anti-rulle båndet i handsken sidder fast på kitlen.



2. Yderemballagen åbnes nu af sygeplejersken med gulvfunktion. Tag inderemballagen med hænderne helt dækket af kitlens ærmer.

4. Vip handsken forsigtigt bagover, så den hviler på din venstre eller højre underarm. Handskens tommelfinger er nu ud for din egen tommelfinger.

6. Træk handsken op over kitlens manchet ved at vrikke fingrene frem og tilbage med små bevægelser.

8. Brug din behandskede hånd til at trække kanten af handsken over bagsiden af din anden hånd. Vrik med dine fingre og træk handsken op over din hånd som før, indtil den er helt på plads.

10. Når handskepåtagning og evt. justeringer er afsluttet, skal du strække dine arme for at sikre dig, at handskerne sidder rigtigt.

Udskiftning af kontaminereret/perforeret handske under operation.



11. Hvis der opstår handskepunktur, hvor der er væske tilstede, vil der forekomme en mørk plet på yderhandsken på det sted, hvor punkturen optræder.



12. Fjern yderhandsken ved at trække handskeskaftet ned over hånden, så handsken vender vrangen udad. Smid handsken væk.



13. Kontroller inderhandsken for punktur. Er der punktur, tages handsken af og udskiftes i henhold til de lokale forskrifter. Ellers tørres handsken af med en steril serviet.

Åbn en ny pakke med den rette type Biogel yderhandsker for at sikre, at farveindikations-systemet virker efter hensigten. Tag den nye yderhandske på og sørg for, at skaftet på den er trukket godt op over inderhandsken (ca. 2,5 cm) for at undgå, at den ruller eller glider ned.

Besøg vores hjemmeside for videovægledning til påtagning af kitler og operationshandsker.

Referencer: 1 Folin A.Udpakning af Indicator-dobbelthandskesystem. En Sikker Hånd 2/2009. Mölnlycke Health Care AB.

Læs mere på [www.molnlycke.dk](http://www.molnlycke.dk)